

IŠORINĖS AUSIES UŽDEGIMO GYDYMAS NOVOKAINO BLOKADA

V. Vaitkus

Viena iš dažniau klinikinėje praktikoje pasitaikančių šunų ligų yra išorinės ausies uždegimas [1, 2, 3 ir kt.]. Juo daugiausia (65 % atvejų) serga šunys su nulėpusiomis ausimis [1,2], tad galima teigti, kad polinkis sirgti šia liga sąlygotas genetiškai. Dažniausia ligos priežastis - į ausis patekęs vanduo (maudant), nešvarumai, įvairūs svetimkūniai, parazitai. Be ausų formos, įtakos sergamumui turi organizmo reaktyvumas, alerginė būklė [1,2,3].

Sergančio gyvulio ausis būna skausminga, vidinė kaušelio pusė - parausta. Suaktyvėja ausies sierą gaminančios liaukos, jos išskiria skystesnio negu paprastai ir kelis kartus daugiau eksudato. Šis kaupiasi ausies landoje, dirgina ir mirko epidermį. Šuo pasidaro neramus, nuolat purto galvą. Palpuojant ausies pagrindą, girdėti žliugsėjimas.

Liga gana sunkiai įveikiama. Nors ir gydoma, ji neretai virsta lėtine. Dėl to ausies landoje atsiranda erozijų, vėliau gali prasidėti verukozinis otitas, būti perforotas ausies būgnelis.

Daugeliui panašios eigos kitų kūno vietų uždegimui gydyti efektyvios yra 0,25-0,5 % novokaino blokados. Jų poveikio mechanizmas ištirtas ir aprašytas. Tačiau mums nepasitaikė literatūros, kur būtų aprašytas toks išorinės ausies uždegimo gydymo būdas.