

ŠUNŲ FOLIKULINIO AKIŲ JUNGINĖS UŽDEGIMO GYDYMAS

A.Noreika

Santrauka. 1991-1999 m. LVA Stambiųjų gyvulių klinikose ir dr. L.Kriaučeliūno smulkiųjų gyvulių klinikoje gydyti 172 šunys, sergantys folikuliniu konjunktyvitu. Vienos grupės šunys gydyti tik kortikosteroidais (deksametazono ar prednizolono lašais), kitos - kortikosteroidais gydyti po to, kai limfiniai mazgeliai suardyti aštriu šaukšteliu arba prideginti sidabro nitrato pieštuku ar termiškai apdoroti elektrokoagulatoriumi. Nustatyta, kad folikuliniu konjunktyvitu sergančius šunis kortikosteroidais teko gydyti 2 mėn. ir ilgiau, 57 % jų liga pasikartojė. 47 % šunų, kuriems limfiniai mazgeliai prideginti sidabro nitrato pieštuku, procedūrą reikėjo kartoti, o 6 % šunų prisidėjo komplikacijų. Tiems šunims, kuriems limfiniai mazgeliai prideginti elektrokoagulatoriumi, gydymo kartoti nereikėjo, bet 11,5 % jų liga komplikavosi. Mazgelius suardžius aštriu šaukšteliu, komplikacijų neprisidėjo, bet gydymą teko kartoti 19 % šunų.

Raktažodžiai: šuo, trečiasis vokas, folikulinis konjunktyvitas, gydymo metodai.