

DALINIS ŠUNS KELIO SĄNARIO PRIEKINIO KRYŽMINIO RAIŠČIO TRŪKIMAS: 23 KLINIKINIŲ ATVEJŲ ANALIZĖ

Valdas Vaitkus

Santrauka. Dalinis kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio trūkimas diagnozuotas 23 šunims. Visi šunys užpakaline koja šlubavo vidutiniškai 3,5 mėnesio. Kranio-kaudalinis blauzdos kaulų nestabilumas šlaunikaulio atžvilgiu kelio sąnaryje (teigiamas „stalčiaus“ testas) klinikinio tyrimo metu nustatytas dešimčiai šunų. Septyniems šunims šis testas buvo teigiamas, tik tiriant kelio sąnarį sulenктоje padėtyje. Visiems šunims atlikta lateralinė parapatelarinė artrotomija, kurios metu nustatyta, jog iš dalies trūkęs priekinis kryžminis raištis. 19 šunų diagnozuotas priekinio kryžminio raiščio kranio-medialinio, 1 – kaudolateralinio pluoštų trūkimas. Trijų šunų raiščiai buvo ištempti ir nebeatliekantys savo funkcijos.

Raktažodžiai: šunys, kelio sąnarys, kryžminiai raiščiai, trūkimas.