

## KORELIACIJA TARP įvairių VEISLIŲ ŠUNŲ BURNOS ERTMĖS BŪKLĖS IR jų ŠĖRIMO

Agris Ilgažs, Edīte Birgele

**Santrauka.** Tyrimų tikslas – nustatyti, ar šunų burnos ertmės būklė priklauso nuo to, kaip jie šeriami. Latvijos žemės ūkio universiteto Veterinarinės medicinos fakulteto klinikoje ištirta 315 įvairių veislių šunų klinikinė ir bakteriologinė burnos ertmės būklė. Atsižvelgta į šunų šėrimo skirtumus. 268 šunims diagnozuota įvairių stomatologinių sutrikimų. Jų priežastis nustatyti suformuotos dvi grupės po 70 šunų kiekvienoje. Pirmosios grupės šunys šeriti namie gamintu maistu, o antrosios grupės šunys – komerciniu būdu pagamintais sausaisiais pašarais. Ištirtas 12 praktiškai sveikų šunų ir 61 periodontitu sergančio šuns mikrobiologinis burnos ertmės spektras. Nustatyta, kad 79 % šunų sirgo įvairiomis burnos ertmės ligomis, daugiausia periodontitu. Stomatologinės ligos dažniau diagnozuotos šunims, šertiems namie gamintu maistu. Praktiškai sveikų šunų burnos ertmėje aptiktas vienodas skaičius gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų.

**Raktažodžiai:** periodontitas, mikroflora, burnos ertmė.