

PLIKYTŲ KOMBINUOTŲJŲ PAŠARŲ ĮTAKA PENIMŲ KIAULIŲ PRIESVORIUI IR SKERDENOS RODIKLIAMS

Stasys Juknevičius, Ana Žilinskienė

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Augalininkystės ir gyvulininkystės katedra, Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno r.; tel. (8-37) 75 22 41, el. paštas: paslab@nora.lzuu

Santrauka. Tirtas plikytų kombinuotųjų pašarų iš miežinių ir vietinių baltymingų grūdų miltų poveikis penimų kiaulių penėjimo ir skerdenos rodikliams. Nustatyta, kad penimos kiaulės, gavusios plikytų kombinuotų pašarų, per parą priaugo 7,64% daugiau nei kiaulės, šertos tais pačiais pašarais, atskiestais šaltu vandentiekio vandeniu. Bandomųjų kiaulių skedenoje geresni buvo ir raumeningumo parametrai.

Tačiau kombinuotųjų pašarų paruošimo būdai prieš šeriant, skerdenų išėigai, užpakalinių kumpių svoriui, lašinių storiui ir vidaus organų išsivystymui esminės įtakos neturėjo.

Raktažodžiai: plikyti pašarai, penimos kiaulės, priesvoris, skerdena, mėsingumas, skerdenos morfologinė sudėtis.