

ŠUNŲ KLUBO SĄNARIO DISPLAZIJA

Juozas Kvalkauskas

¹*Lietuvos veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, LT – 47181 Kaunas; tel. (8~37) 36 23 03; faks. (8~37) 36 24 17*

Santrauka. Šunų klubo sąnario displazija yra paveldima patologija, kai šlaunikaulio duobutė išstumama iš klubaduobės ir vystosi sąnario nestabilumas ir osteoartritas. Klubo sąnario klinikiniai ir rentgenologiniai tyrimai, dėl displazijos buvo atliekami veisliniams šunims ir tiems, kurie turėjo šio susirgimo požymių. Klinikinio tyrimo metu stebėjome, kaip šuo stato užpakalines kojas, kaip sėdasi, gulasi, keliasi, Ortolani metodu buvo tiriamas klubo sąnario laisvumas anestezuotiems šunims. Šunims, sergantiems klubo sąnario displazija, rentgeno tyrimo metu nustatoma: klubo sąnario laisvumas, negili klubaduobė, pakitusios formos šlaunikaulio galvutė, patloginės kaulinės išaugos klubo sąnario srityje, atsirandančios dėl kompensacinės organizmo reakcijos į pakitusias nesveiko sąnario funkcionavimo sąlygas. Tyrimai rodo, kad tiek klubaduobės, tiek šlaunikaulio galvutės kremzliniai paviršiai deformuojasi, todėl pokyčiai negrįžtami. Šiuos pakitimus turintys šunys mažai juda, daugiau guli, sunkiai keliasi, sunkiai lipa laiptais, šlubuoja.

Per praėjusį dešimtmetį (1994–2003m.) Lietuvoje ištirta 1 727 šunys, iš jų 714-ai nustatyta klubo sąnario displazija, t. y. 41,3%. Dažniausiai klubo sąnario displazija sergo: Neapolio mastinai, Kaukazo aviganiai, rotveileriai ir anglų buldogai. Jauniems šuniukams nuo 4 mėn. amžiaus tik labai retais atvejais yra matomi ryškūs klinikiniai klubo sąnario požymiai.

Raktažodžiai: šuo, klubo sąnarys, displazija.